

D6	Pour améliorer les qualités nutritives du lait maternel, par exemple lorsque l'enfant a besoin d'un lait plus substantiel après une poussée de croissance et paraît ne plus être rassasié après la tétée ; à la place d'introduire trop rapidement des compléments.	une fois 2 - 3 globules à la maman (à renouveler éventuellement)
	Acné du nouveau-né (ATTENTION, aggravation thérapeutique possible ! Monter la dilution si nécessaire)	2-3 globules matin et soir (1 jour)
	Eruption cutanée (exanthème) saisonnière	3 globules jusqu'à 3x/jour durant plusieurs jours (jusqu'à amélioration ou cessation des plaintes)
D6 ou D8	Douleur dentaires	3 globules toutes les ½ heures jusqu'à amélioration puis 3x/j jusqu'à cessation des plaintes
	Poussée de développement (l'enfant est grincheux car il tente de faire quelque chose de nouveau mais n'y parvient pas)	2 globules 3x/j jusqu'à ce que l'enfant soit à nouveau plus serein
	Lors de refroidissements (chez les enfants/les bébés), toux, rhume, immédiatement dès l'apparition des symptômes	2 - 3 globules dès les 1ers symptômes puis 3x/j jusqu'à amélioration
D8	Pour aider la cicatrisation de petites blessures	2-3 globules toutes les 2h
D8 ou D12	Ballonnements, coliques Muguet	2-3 globules toutes les 2h (plus souvent si nécessaire) Plusieurs fois/j 2 globules
D12	Lors de légers troubles ou douleurs avant et/ou pendant les règles	3x/j 2 globules, à débiter 3j avant les règles
D20	Pour des inconforts ou maux plus importants, comme régulation lors de cycles irréguliers chroniques, par exemple. Irritations de la peau (croûtes de lait, p.ex)	3x/j 2 globules, à débiter 3j avant les règles 1x 2-3 globules, répétition si besoin
D30	Troubles du sommeil chez l'enfant Etats d'épuisement, aussi chez l'adulte (p.ex perte d'énergie après la grossesse, resp. l'accouchement ou lors de besoins accrus, p.ex avant un enjeu sportif) Lors de refroidissements chez l'adulte Lors de maladies ou refroidissements de l'enfant/du bébé lorsque la D8 ne suffit plus. Souffrir de météorisme Après une vaccination (pour éviter les effets secondaires comme la fièvre, p.ex)	1x 2 globules, répétition si besoin 1x 3 globules, répétition si besoin 2-3x/j 6 globules 1x/j 2 globules 1x 2 globules, répétition si besoin 1x 2 globules, répétition si besoin

Isothérapie placentaire - mentop vac® Plazenta

Il n'existe pas de recommandation traditionnelle concernant l'utilisation de l'isothérapie placentaire - **mentop vac® Plazenta**. Le tableau suivant se base uniquement sur la transmission orale, resp. sur les nombreuses expériences empiriques de sages-femmes ou de naturopathes. Cela peut servir aussi de l'utilisation de **mentop vac®** à base du lait maternel et du sang du cordon ombilical.

Selon les fondements même de l'homéopathie, il n'existe pas de risque d'effets secondaires, ou plutôt de conséquences indésirables. Toutefois, on peut être confronté au concept « d'aggravation thérapeutique » : c'est-à-dire que les symptômes peuvent éventuellement être d'abord amplifiés par la prise du remède. Pour y remédier, il suffit de réduire la fréquence des prises ou de choisir une autre (plus haute) dilution.

Les remèdes homéopathiques sont des moyens éprouvés et utilisés avec succès. En principe il est considéré que en homéopathie le remède correct est plus important que la dilution. Toutefois lors de graves maladies, il convient d'en mesurer les limites. Mais même dans ces cas-là, ils peuvent être utilisés avec profit comme traitement complémentaire en association avec les médicaments spécifiques à la maladie. En général il est conseillé de se conférer avec le médecin de naturothérapie, la sage femme ou un/une naturopathe.

Il est conseillé d'effectuer les observations correctes des réactions suite à l'administration pour découvrir quelle dilution est la mieux adaptée à quel problème. Le résultat des observations devrait être conservé de façon à pouvoir utiliser au mieux l'isothérapie placentaire - **mentop vac® Plazenta** - en cas de réapparition de la maladie.

En principe, les recommandations de dosage usuelles en homéopathie sont valables pour l'isothérapie placentaire :

La dose recommandée par prise est de 5 globules pour les adultes, 3 globules pour les enfants et 2 globules pour les bébés.

La fréquence d'administration est liée à la dilution : de D6 à D12, on peut donner jusqu'à toutes les $\frac{1}{2}$ heures dans les situations très aiguës, toutes les 2 heures pour les cas aigus ou sinon 2-3x par jour jusqu'à disparition de la plainte. Le D20 ou le D30 ne sont administrées qu'en dose unique, voire 1x par jour si persistance des troubles.

Bulletin de commande pour une isothérapie mentop vac® à usage oral
 Nous avons l'autorisation de production d'après le §13 sur AMG (la législation des médicaments)

Données du patient (écrire en capitales svp) _____ Nom, prénom _____ Nom, prénom du bébé Date de naissance _____ Rue, N° _____ Code postal, Lieu, Pays matériel prélevé (marque par un croix s.v.p.): <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> lait maternel <input type="checkbox"/> sang de cordon ombilical _____ Téléphone, adresse e-mail	Demandée, recommandée par (n'est pas indispensable à remplir): _____ Lieu, date, signature du patient
Clarification concernant la prise en charge des coûts : je vous charge de préparer une mentop vac® selon le choix indiqué ci-dessous et je m'engage à assumer les coûts y relatifs.	

Pour simplifier la commande de votre remède homéopathique individuel – une isothérapie mentop vac® - nous avons déjà proposé la commande des dilutions courantes en granules ainsi que la «mentop vac® D3 Stammlösung» (la teinture mère, une solution pour des commandes ultérieures). **Le prix global de cette fabrication recommandé est 104,61€** sans port et emballage.

Naturellement, vous pouvez faire une commande différente, p.e. d'autres dilutions ou des flacons en plus. Utiliser pour cela la case ci-après sans indication. Vous pouvez alors obtenir le prix de cette commande en nous demandant. Le prix n'est pas fonction de la quantité commandée, mais tient compte de la plus haute dilution souhaitée, car la charge de travail est prise en considération. Veuillez prendre note que une dilution en D3 ne peut pas être utilisée pour recommander des flacons en C et inversement.

S'il n'y pas d'autres indications vous allez recevoir les dilutions courantes comme mentionné ci-dessous:

- isothérapie mentop vac® D6, D8, D12, D20, D30 chaque une tube granules 10g (toutes 99,25€)
- mentop vac® D3 Stammlösung flacon 10ml (5,36€ lors de commande supplémentaire de globules)
 (teinture mère pour des commandes ultérieures)

Pour votre commande individuelle marquez d'une croix s.v.p. si vous désirez
 différentes dilutions (en ce cas vous n'allez pas recevoir notre proposition) ou en plus

Noter ici svp les dilutions souhaitées	Cocher ici svp pour indiquer sous quelle forme vous désirez le produit.
<input type="checkbox"/> Isothérapie mentop vac® D _____ svp indiquer les dilutions individuelles souhaitées	<input type="radio"/> flacon 10ml <input type="radio"/> flacon 50ml <input type="radio"/> tube granules 10g (tous les prix sur demande)
<input type="checkbox"/> mentop vac® D3 Stammlösung (teinture mère pour commandes ultérieures en "D")	<input type="radio"/> flacon 10ml
<input type="checkbox"/> Isothérapie mentop vac® C _____ svp indiquer les dilutions individuelles souhaitées	<input type="radio"/> flacon 10ml <input type="radio"/> flacon 50ml <input type="radio"/> tube granules 10g (tous les prix sur demande)
<input type="checkbox"/> mentop vac® C3 Stammlösung (teinture mère pour commandes ultérieures en "C")	<input type="radio"/> flacon 10ml

Envoyer le formulaire de commande avec le matériel prélevé à :

Mentop Pharma e.K.
 Georg-Ohm-Str. 6
 D-24837 Schleswig
 Tél. +49 4621 95 96 0 Fax 95 96 20
 e-mail: info@mentop.de

Vous allez recevoir votre mentop vac® et la facture par la pharmacie en bas à votre adresse.
Adler Apotheke am Wasserturm
 Schubyst. 89 b
 D- 24837 Schleswig

Prélèvement d'un échantillon de placenta pour la fabrication d'un remède homéopathique

Pour respecter les exigences professionnelles et légales en matière de qualité, le prélèvement de l'échantillon de placenta pour la fabrication d'un remède homéopathique doit se faire dans les conditions suivantes :

1. Conditions extérieures

Le prélèvement d'un morceau de placenta, de la taille d'un petit pois, doit se faire dans les conditions d'hygiène inhérentes à une bonne pratique professionnelle. Lorsque que ce prélèvement intervient dans le cadre d'une naissance à l'hôpital ou en maison de naissance, les normes d'hygiène obligatoires sont remplies (récipients et instruments propres). Un environnement stérile n'est pas nécessaire puisque tout le système de l'échantillonnage (récipient – morceau de placenta - solution de conservation) est passé à l'autoclave avant la fabrication.

2. Prélèvement

Avant le prélèvement, les mains doivent être soigneusement lavées et désinfectées. Le port de gants à usage unique est recommandé. Le morceau de placenta devrait de préférence être prélevé à proximité de l'insertion du cordon, sur la face maternelle, et être de la taille d'un petit pois au maximum. Il est recommandé d'utiliser un scalpel stérile à usage unique pour le découper. Si ce n'est pas le cas, les instruments utilisés doivent être préalablement désinfectés (eau bouillante, alcool). L'insertion de l'échantillon de placenta dans le flacon en verre fourni doit être exécutée avec une pincette désinfectée, le scalpel ou le couteau. Pour recueillir le petit morceau de tissu, n'utiliser svp que le flacon contenant le mélange alcool-eau-glycérine mis à disposition par Mentop Pharma. Ensuite refermer soigneusement le bouchon.

Étiquetage : pour garantir une classification claire de l'échantillon de placenta avec la commande - et de ce fait au patient – il est indispensable d'inscrire le nom du patient, resp. les autres données utiles, sur l'étiquette du flacon. L'affectation « pour fabrication d'isothérapie » est déjà donnée par Mentop Pharma. Si le flacon fourni par Mentop Pharma n'était pas disponible, le petit morceau de placenta peut être congelé dans un récipient propre, approprié pour conserver les denrées alimentaires, et être transféré plus tard dans le flacon sus-mentionné. Pour préserver les qualités thérapeutiques de la préparation, cela devrait être fait au plus vite, mais en aucun cas au-delà d'une année après la naissance.

3. Envoi

Placer le flacon dans le récipient de protection fourni pour le préserver durant l'expédition. L'envoi devrait parvenir à Mentop Pharma dans les quelques jours, aussi une réfrigération ou un envoi express ne sont pas nécessaires. L'envoi de l'échantillon et de la commande peut être fait par la pharmacie, la sage-femme ou les parents eux-mêmes.

Pour pouvoir garantir la qualité de fabrication de l'isothérapie placentaire dès le prélèvement de l'échantillon, nous vous prions de respecter les recommandations ci-dessus.

Résumé:

- Environnement propre
- Porter des gants à usage unique
- Préparer le flacon contenant la solution de conservation fourni par Mentop Pharma et les instruments
- Insérer un morceau de placenta de la taille d'un petit pois dans le flacon contenant la solution de conservation
- **Étiqueter le flacon avec le nom de la mère ou de l'enfant**
- Insérer le flacon en verre contenant l'échantillon de placenta dans le récipient de protection en plastique pour le transport
- Envoi de l'échantillon avec le formulaire de commande remplis à Mentop Pharma par courrier normal
- Réfrigération non nécessaire !